

# Flagyl®

métronidazole

60 ans  
de recul<sup>1</sup>

Antiparasitaire & antibactérien<sup>2</sup>

*De génération  
en génération<sup>1</sup>*



SAMA.MTZ.II.0250

SANOFI

# Flagyl®

métronidazole

Antiparasitaire & antibactérien<sup>2</sup>

*De génération en génération<sup>1</sup>*



60 ans  
de recul<sup>1</sup>

1 - Core claim, SAQLB.MTZ.I7.06.0641a, page 5.  
2 - Mentions légales Flagyl.

SANOFI

- 1. Large spectre antiparasitaire & antibactérien<sup>2</sup>.**
- 2. Absorption complète par voie orale<sup>2</sup>.**
- 3. Distribution dans l'organisme : dans les tissus ou les sécrétions<sup>2</sup>** (Poumons, reins, foie, peau, bile, LCR, salive, liquide séminal, sécrétions vaginales).

**Large spectre antiparasitaire et antibactérien<sup>2</sup>**

Activité Antibactérienne			Activité Antiparasitaire
Gram + anaérobies	Gram - anaérobies	Gram - aérobies	Protozoaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clostridia, dont Clostridium difficile</li> <li>• Eubacteria</li> </ul>	Bacteroides Fragilis	Helicobacter pylori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trichomonas vaginalis</li> <li>• Entamoeba histolytica</li> <li>• Giardia intestinalis</li> </ul>

## L'EFFICACITÉ PROUVÉE :

Diffusion tissulaire rapide & importante<sup>2</sup>

## LE REcul :

+60 ans d'utilisation<sup>1</sup>

1<sup>er</sup> Nitro-imidazolé au Maroc<sup>3</sup>

## LA SÉCURITÉ :

Peut être administré à l'enfant\*<sup>2</sup>

Amibiase : Posologie ( 7 jours ) <sup>2</sup>	
Adulte	Enfant
1 cp à 500 mg	30 à 40 mg/kg/jour
	250 mg Matin    250 mg Midi    250 mg Soir

Giardiase : Posologie ( 5 jours ) <sup>2</sup>		
Adulte		
1 g / Jour	ou	750mg / jour
Enfant		
2 à 5 ans	5 à 10 ans	10 à 15 ans
250 mg/j**	375 mg/j**	500 mg/j

Infections à trichomonas : Posologie (10 jours) <sup>2</sup> †		
10 jours		prise unique
cp 250 mg	Ovule 500 mg	2g
	au coucher	

Vaginoses bactériennes : Posologie (7 jours) <sup>2</sup>	
Adulte	
500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours§	

1 - Core claim, SAGLB.MTZ.17.06.0641a, page 5.  
 2 - Mentions légales Flagyl.  
 3- DATAVIEW IMS MAT SEPT 2017.

\* Peut être administré à l'enfant à partir de 2 ans pour la suspension buvable et à partir de 6 ans pour le comprimé.  
 \*\* Une dose unitaire de 200 mg de métronidazole (benzoates), correspond à une cuillère-mesure de 5 ml.  
 † Que le partenaire présente au nom des signes cliniques d'infestation à trichomonas vaginalis, il importe qu'il soit traité concurremment, même en l'absence d'une réponse positive du laboratoire.  
 § Un traitement simultané du partenaire doit être pratiqué.