

Stilnox
zolpidem 10mg

STILNOX[®]CR
TARTRATE DE ZOLPIDEM 12,5mg

POSOLOGIE³



Adulte: 10mg/j*

Sujets Agés
ou fragilisés : 5mg/j*

Adulte: 12,5mg/j*

Durée de quelque jours à QUATRE semaines *

* La durée du traitement doit être aussi bref que possible.

1. Priest R, Terzano M, Parrino L, Boyer P. Efficacy of zolpidem in insomnia. Eur Psychiatry. 1997;12 Suppl 1:5-14.
2. Wilson S, Anderson K, Baldwin D, Dijk DJ, Espie A, Espie C, Gringras P, Krystal A, Nutt D, Selsick H, Sharpley A. British Association for Psychopharmacology consensus statement on evidence-based treatment of insomnia, parasomnias and circadian rhythm disorders: An update. J Psychopharmacol. 2019 Aug;33(8):923-947.
3. Mentions légales.

Mentions légales
Stilnox 10 mg



Mentions légales
Stilnox CR



SANOFI

Stilnox
zolpidem 10mg

STILNOX[®]CR
TARTRATE DE ZOLPIDEM 12,5mg

Respecter l'Architecture Physiologique du sommeil

SAMAZOL.19.11.0265



SANOFI

*Durée de quelque jours à QUATRE semaine

LES SYMPTOMES DE L'INSOMNIE ²

(SELON L'Internatinal Classification of sleep Disorders)

RAPPORTER PAR LES PATIENTS OU SON ENTOURAGE ²



AVEC AU MOINS UNE FORME DE DYSFONCTIONNEMENT DIURNE : Fatigue; trouble de l'humeur; problèmes interpersonnels; fonction cognitive réduite; performance réduite; La somnolence diurne; problèmes de comportement (par exemple hyperactivité, impulsivité, agression); motivation / initiative réduite; tendance aux erreurs / aux accidents.²

STILNOX

est indiqué dans le traitement de ³ :

**INSOMNIE
TRANSITOIRE**

2 à 3 semaines

**INSOMNIE
OCASIONNELLE**

2 à 5 jours

MODE D'ACTION

STILNOX

se fixe de façon
préférentielle
sur le sous type
oméga 1 (ou BZ1)³

BENEFICES

PROLONGE

Le stade II
Le sommeil profond (III et IV)

PAS D'INFLUENCE

Sur la durée totale du
sommeil paradoxal (R.E.M.)